

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 24-6-68 794842

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DES PAYS DE LA LOIRE
EDITION DE LA STATION ~~DE LA LOIRE~~ ANGERS
(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, ~~DEUX-SÈVRES~~, VIENNE) MAYENNE
~~Région de la Loire-Atlantique, de la Sarthe, de la Mayenne, de la Vendée, de la Deux-Sèvres, de la Vienne~~
C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL
25 F.

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 93 de JUIN 1968 - SARTHE, MAYENNE	P. 29
DEUX-SÈVRES	P. 28
VIENNE	P. 27

AVERTISSEMENTS -

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES - Départements de la Sarthe et de la Mayenne.

Les conditions climatiques ont en général été peu favorables à l'évolution du Carpo-
capse et les pontes sont dans l'ensemble peu abondantes. Il convient d'effectuer un trai-
tement :

- au début de la semaine du 24 au 29 Juin, dans tous les vergers du Sud de la Sarthe et de la Mayenne, y compris dans ceux protégés conformément à la note du 6 Juin.
- à la fin de la semaine du 24 au 29 Juin, dans les vergers du Nord de la Sarthe et de la Mayenne.

Département des Deux-Sèvres, région de la Gâtine.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, des pontes ont été déposées. Elles vont arriver à éclosion dans le milieu de la semaine du 24 au 29 Juin. En conséquence, dans tous les vergers de poiriers et de pommiers, y compris dans les vergers de Reinette Clochard cultivés en forme haute tige, effectuer un premier traitement dans le milieu de la semaine du 24 au 29 Juin.

TAVELURE DU POIRIER ET DU POMMIER - Dans les départements de la Sarthe et de la Mayenne, les récentes précipitations orageuses localement très abondantes ont pu éliminer la protec-
tion contre la Tavelure. En cas de nécessité, profiter du traitement anti-Carpocapse pour la renouveler.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, les projections d'ascospores sont pratiquement terminées. Toutefois, les taches existent dans de nombreux vergers et d'au-
tres doivent apparaître encore. Il est donc conseillé d'ajouter un produit anti-Tavelure à la bouillie anti-Carpocapse.

INFORMATIONS -

OIDIUM DU POMMIER - En cas de nécessité, ajouter un produit actif contre cette maladie à la bouillie destinée à lutter contre le Carpo-
capse.

PSYLLE DU POIRIER ET PUCERONS DIVERS - Particulièrement dans les vergers des départements de la Sarthe et de la Mayenne, on signale des attaques de ces parasites. En cas de néces-
sité, ajouter à la bouillie destinée à lutter contre le Carpo-
capse un produit actif contre ces insectes.

SESIE DU CASSISSIER - Le vol continue. Dans les cultures habituellement contaminées, effec-
tuer un nouveau traitement. Ce traitement pourra être repoussé aussitôt après la récolte en fonction de la date de celle-ci et de la nature du produit utilisé.

.....

.....

SARTHE, MAYENNE P. 30
DEUX-SEVRES P. 29
VIENNE P. 28

AVERTISSEMENTS -

VIGNE

MILDIU - Dans le vignoble de NEUVILLE EN POITOU, les foyers de Mildiou sont extrêmement nombreux. Les récentes pluies ont assuré de nouvelles contaminations dont les taches seront visibles vers la fin de la semaine du 24 au 29 Juin. Des attaques sur grappes risquent de se produire. La situation est extrêmement dangereuse. En conséquence, dans toutes les parcelles de vigne dans lesquelles le traitement conseillé dans la note du 18 Juin n'a pu encore être réalisé, effectuer un traitement immédiat. Dans les parcelles de vigne où le traitement conseillé dans la note du 18 Juin a été réalisé et où il a été lessivé par les récentes pluies, effectuer également un traitement immédiat. Dans les parcelles de vigne où le traitement vient d'être effectué et où il n'a pas été éliminé par les pluies, il est inutile d'intervenir à nouveau.

Dans les parcelles où les taches sont nombreuses, il est conseillé, pour protéger les grappes, de compléter ce traitement en pulvérisation par un poudrage avec un produit homologué.

BLACK-ROT - Dans le vignoble de NEUVILLE EN POITOU dans la Vienne, les taches de Black-rot sont également nombreuses et disséminées dans l'ensemble du vignoble. Le traitement dirigé contre le Mildiou sera actif contre le Black-rot; il doit être exécuté immédiatement et avec beaucoup de soins.

INFORMATIONS -

OIDIUM - Profiter du traitement dirigé contre le Mildiou pour assurer la protection contre l'Oïdium en ajoutant à la bouillie anti-Mildiou un produit homologué.

POMMES DE TERRE

MILDIU - La situation risque de devenir particulièrement dangereuse, surtout dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe. En conséquence, étendre d'urgence à toutes les cultures non destinées à un prochain arrachage, le traitement conseillé dans la note du 18 Juin. Renouveler ce traitement partout où il a déjà été fait et où il a été éliminé par de toutes récentes précipitations.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIU DE LA TOMATE - Renouveler le traitement conseillé dans la note du 18 Juin, s'il a été éliminé par les pluies.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

Tirage du 21 JUIN 1968.